


5

Efectos secundarios

Efectos secundarios locales	32
Efectos secundarios poco frecuentes	33
Efectos secundarios específicos de la lipólisis	33



En el estiramiento cutáneo por mesoterapia con técnica epidérmica puede aparecer como máximo una pequeñísima gota de sangre.



Una técnica inadecuada de aplicación de la inyección provoca rasguños, hematomas y un paciente insatisfecho.

5 Efectos secundarios

Los efectos secundarios pueden ser provocados por los principios activos utilizados o por la técnica de inyección. En el caso de los remedios alopatícos se debe observar el prospecto adjunto y en los productos elaborados la indicación de la compañía. En general, en las aplicaciones locales de baja dosis no cabe esperar efectos sistémicos, sobre todo en la aplicación epidérmica. Cuanto mayor sea la cantidad de principio activo, cuanto mayor su potencia y cuanto más profunda la inyección, tanto mayor será la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios locales y sistémicos. Independientemente de esto, en toda práctica pueden presentarse alergias y se deben tomar los recaudos correspondientes. Pero un eritema típicamente reactivo (dermografismo) o un eritema inducido farmacológicamente, p. ej. por buflomedil o PPC, deberían reconocerse y no confundirse con una reacción alérgica. Lo mismo rige para tejidos sensibles, como la zona de los labios o de los ojos, que reaccionan con hinchazón considerable, tan solo por el estímulo físico.

La inocuidad de la mesoterapia ya fue demostrada hace muchos años en los estudios franceses ENA-TOME I y II. Las reacciones sistémicas vegetativas son posibles, pero raras. Hasta ahora en la bibliografía también se mencionan muy pocos efectos secundarios, la mayoría de los cuales se debieron a procedimientos erróneos o no higiénicos.

Efectos secundarios locales

Los efectos secundarios localizados de la mesoterapia aparecen en forma reversible, de corta duración y, ante todo, en el primer tratamiento: leve dolor, hemorragias, pequeños hematomas, eritemas leves, hinchamientos, descamado de la piel, rasguños discretos, dermografismo. Estas "primeras reacciones" son fenómenos conocidos de la medicina natural y se deberían explicar al paciente del siguiente modo: se trata de un proceso profundo de limpieza y reparación de la piel y del tejido conjuntivo.



Dermografismo rojo de corta duración después de líneas epidérmicas sucesivas con agregado de Buflomedil. La vasodilatación capilar empalidece a los pocos minutos.

Solo sobre esta base se puede desarrollar el rejuvenecimiento y embellecimiento deseados a largo plazo. Las eventuales reacciones de la piel se pueden ocultar poco después del tratamiento con un corrector de color adecuado, polvo o maquillaje. En caso de necesidad también se puede remediar con un camuflaje.

Efectos secundarios poco frecuentes

Aún observando cuidadosamente todos los recaudos, en algunos casos raros se pueden dar reacciones alérgicas. Cuando se conozca la predisposición se podrá administrar previamente un antihistamínico a modo de protección. Algunos mesoterapeutas también agregan algunas gotas de Tavegil® a la mezcla. La activación de infecciones latentes a herpes se puede evitar con la medicación adecuada. Las alteraciones de la pigmentación suelen aparecer después de una exposición no permitida a la radiación solar. En casos extremadamente raros se dan necrosis (asépticas), granulomas, queloides e infecciones.

Efectos secundarios específicos de la lipólisis

Debido al principio activo PPC+DC empleado, en la lipólisis se dan regularmente las irritaciones locales: inmediatamente después de las inyecciones se produce un eritema, edema de los tejidos y prurito. Esta reacción inmediata dura aproximadamente 3 días. Los dolores debidos a la reacción inflamatoria local y eventuales hematomas se pueden sentir durante un máximo de 2 semanas. Esto se contrarresta con enfriamiento, procedimientos especiales de vendaje funcional (*taping*) o tomando una tableta de ibuprofeno la noche del tratamiento. En casos raros, se produce sensibilidad al tacto de mayor duración, formación de nudos o huellas, diarreas o hemorragias intermedias en las mujeres. Después de dosificaciones altas se deben prever reacciones circulatorias, que pueden llegar hasta el colapso. En forma preventiva se debe indicar entonces a los pacientes que ingieran líquidos en abundancia.

Por lo general, los efectos secundarios son inocuos y totalmente reversibles.




En las inyecciones intradérmicas o subcutáneas suele aparecer algo de sangre de las microheridas frescas. Cuanto más profunda la inyección, tanto mayor el peligro de formación de hematomas. Una hemorragia se contrarresta con compresión inmediata.



Alergia después de estiramiento cutáneo por mesoterapia.



Formación de hematoma en el abdomen.



Eritema típico e hinchazón después de lipólisis submandibular.